



4 987438 860740

切り口

切り口

開封後はチャックを閉めて保管してください。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

JPS

販売名：JPS加味逍遙散エキス錠N

漢方製剤

第2類医薬品

△使用上の注意



相談すること

1.次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師の治療を受けている人。(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。(3)胃腸の弱い人。(4)高齢者。(5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(6)次の症状のある人。むくみ (7)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください [皮膚] 発疹・発赤、かゆみ [消化器] 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。[偽アルドステロン症、ミオパチー] 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。[肝機能障害] 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。[腸間膜静脈硬化症] 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。3.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢 4.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 5.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 体力中等度以下での、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症:冷え症、虚弱体质、月經不順、月經困難、更年期障害、血の道症、不眠症 (効能・効果に関する注意) 血の道症とは、月經、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

用法・用量 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。成人(15才以上)1回4錠、7才以上15才未満 1回3錠、5才以上7才未満 1回2錠、5才未満 服用しないこと (用法・用量に関する注意) (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2)食間とは食後2~3時間を指します。

成分・分量 12錠中 加味逍遙散エキス(3/5量)2.28g [日局トウキ 1.8g、日局シャクヤク 1.8g、日局ソウジツ 1.8g、日局ブクリョウ 1.8g、日局サイコ 1.8g、日局ボタンビ 1.2g、日局サンシシ 1.2g、日局カンゾウ 1.2g、日局ショウキヨウ 0.6g、日局ハッカ 0.6g に相当] 添加物:無水ケイ酸、ケイ酸AI、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖水和物

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になります品質が変わることがあります。)(4)本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。(5)本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じことがあります。(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(上段) 使用期限(西暦年、月)/(下段) 製造番号



ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町196-1

発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎ 045-593-2136

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

