

## 第2類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。



## 漢方製剤 JPS 漢方顆粒-66号

酸棗仁湯は比較的体力がなく、心身がつかれ、精神不安などがある方の不眠症、神経症を改善します。体全体の調和をととのえ、精神を安定させる働きがあります。

本剤は漢方処方である酸棗仁湯の生薬を抽出し、乾燥エキスとした後、服用しやすい顆粒剤としました。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
 次の人は服用しないでください  
 生後3ヵ月未満の乳児。



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸の弱い人。
  - 下痢又は下痢傾向のある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 

関係部位	症 状
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
 下痢
- 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【効能・効果】

体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症：不眠症、神経症

## 〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15 才以上）	1 包	3 回
7 才以上 15 才未満	2/3包	
4 才以上 7 才未満	1/2包	
2 才以上 4 才未満	1/3包	
2 才未満	1/4包	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3)食間とは食後2～3時間を指します。

## 〔成分・分量〕

3包(6.0g)中

酸棗仁湯乾燥エキス散3.04gを含有しています。

日局サンソウニン……12.0g	日局チ	モ……2.4g
日局センキュウ……2.4g	日局ブクリヨウ……	4.0g
日局カンゾウ……0.8g		

上記生薬量に相当します

添加物として、二酸化ケイ素、ステアリン酸Mg、シヨ糖脂脂肪酸エステル、乳糖水和物を含有しています。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は吸湿しやすいので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。(開封状態で置いておくと顆粒が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。)
- (5)本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。  
**ジェピーエス製薬 お客様相談室**  
 電 話 045-593-2136  
 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
 (独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



**ジェピーエス製薬株式会社**

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1  
 発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22