



4 987438 862546

切り口

切り口

開封後はチャックを閉めて保管してください。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

JPS

販売名：JPS小青竜湯エキス錠N

漢方製剤

第2類医薬品

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起したことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください [皮膚] 発疹・発赤・かゆみ [消化器] 吐き気、食欲不振、胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 [間質性肺炎] 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 [偽アルドステロン症、ミオバチー] 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 [肝機能障害] 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 3.1ヵ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るもの次の諸症: 気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

用法・用量 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。成人(15才以上)1回4錠、7才以上15才未満1回3錠、7才未満服用しないこと [用法・用量に関する注意] (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2) 食間とは食後2~3時間間を指します。

成分・分量 12錠中 小青竜湯エキス(1/2量)2.5g [日局マオウ 1.5g、日局シャクヤク 1.5g、日局カンキョウ 1.5g、日局カンゾウ 1.5g、日局ケイヒ 1.5g、日局サイシン 1.5g、日局ゴミシ 1.5g、日局ハンゲ 3.0g に相当] 添加物: 無水ケイ酸、ケイ酸AI、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖水和物

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります、効能・効果には変わりありません。(5) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(上段) 使用期限(西暦年、月)/(下段) 製造番号



ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎ 045-593-2136

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

