



切り口

切り口

開封後はチャックを閉めて保管してください。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。



販売名：JPS麻子仁丸料エキス錠N

漢方製剤

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤) 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください〔消化器〕はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢 4.5~6日間服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なものの次の諸症：便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

用法・用量 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。成人(15才以上)1回3錠、7才以上15才未満 1回2錠、5才以上7才未満 1回1錠、5才未満 服用しないこと 〈用法・用量に関連する注意〉(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2) 食間とは食後2~3時間を指します。

成分・分量 9錠中 麻子仁丸料乾燥エキス散2.25g〔日局マシニン 3.75g、日局シャクヤク 1.5g、日局キヅツ 1.5g、日局コウボク 1.5g、日局ダイオウ 3.0g、日局キョウニン 1.5g に相当〕 添加物：二酸化ケイ素、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖水和物

保管及び取扱上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。(5) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(上段)使用期限(西暦年、月)/(下段)製造番号



ジェービーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1
発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎045-593-2136

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

