

第②類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

鎮咳去痰薬
とをしや鎮咳去痰剤

とをしや鎮咳去痰剤はジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩の作用により、せきをしずめ、グアイフェネシンにより、たんを切れやすいものとなりました。さらに咽喉に作用し、去痰作用のあるカンゾウ、キキョウを配合しました。
本剤は、のどにやさしく、苦しいせき、たんの改善に効果をあらわします。

 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
- 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
 - 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
 - 3. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
 - 4. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱、むくみ、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
- 4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

せき及びたん

【用法・用量】

次の量を毎食後に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
11才以上15才未満	2／3包	
8 才以上11才未満	1／2包	
5 才以上 8 才未満	1／3包	
5 才未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。

【成分・分量】

3包（4.5g中）に次の成分を含有しています。

成 分	含 量	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
グアイフェネシン	300mg	たんを切れやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	かぜのアレルギー症状（鼻水・くしゃみ）をおさえます。
カンゾウエキス （カンゾウとして1000mg）	200mg	炎症をしずめます。
キキョウエキス （キキョウとして500mg）	111.1mg	のどに作用し、たんを切れやすくします。

添加物として、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)本剤は吸湿しやすいので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。（開封状態で置いておくとうと顆粒が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。）
- (5)本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果にはかわりありません。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
あるいは下記にお願いいたします。
ジェーピーエス製薬 お客様相談室
電 話 045-593-2136
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

ジェーピーエス製薬株式会社

栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1