

# 葛根湯液

## 第2類医薬品

### 【使用上の注意】



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸の弱い人。
  - 発汗傾向の著しい人。
  - 高齢者
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起したことがある人。
  - 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：  
感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

### 【用法・用量】

成人（15才以上）10mL、7才以上15才未満5mLを1日3回食前又は食間に服用してください。  
（7才未満は服用しないこと。）

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 食間とは食後2～3時間を指します。
- 本剤は本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。
- 添付のカップをご利用ください。

### 【成分・分量】 1日量〔1本（30mL）〕中

日局葛根湯エキス 2.4g（日局カクコン4g、日局マオウ3g、日局タイソウ3g、日局ショウキョウ2g、  
日局ケイヒ2g、日局シャクヤク2g、日局カンゾウ2g に相当）  
添加物：DL-リンゴ酸、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 封をあけたまま保存しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

## ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 電話 045-593-2136

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—