

第2類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

婦人薬
 婦人華N

婦人華Nは女性用薬として代表的な漢方処方の当帰芍薬散、桂枝茯苓丸を基本として、さらにニンジン、カンゾウを加えて生薬エキスとし、これにサフランとビタミンE(酢酸d-α-トコフェロール)を加え、服用しやすいフィルムコート錠としました。月経不順、月経痛、冷え症、肩こり、更年期障害等にすぐれた効果をあらわします。

 使用上の注意

 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください

牛乳によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振

〔効能・効果〕

月経不順、月経痛、血の道症^{注1)}、こしけ^{注2)}、冷え症、のぼせ、貧血、めまい、腰痛、頭痛、肩こり、更年期障害

〈効能・効果に関連する注意〉

注1) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。
注2) こしけとは、おりもののことです。

〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	3 錠	3 回
15才未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)食間とは食後2～3時間を指します。

〔成分・分量〕

9 錠中

生薬乾燥エキス	1200 mg	
日局シャクヤク …… 533 mg 日局ビャクジュツ …… 533 mg 日局ケイヒ …… 533 mg 日局ニンジン …… 666 mg 日局ブクリョウ …… 533 mg 日局トウキ …… 400 mg 日局ボタンピ …… 533 mg 日局カンゾウ …… 533 mg 日局タクシャ …… 533 mg 日局センキュウ …… 400 mg 日局トウニン …… 533 mg	に相当	

酢酸d-α-トコフェロール(2倍散) …… 20 mg

サフラン末 …… 2.5 mg

添加物として、カゼインNa、ラウリル硫酸Na、カルメロースNa、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、トモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴールを含有しています。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
あるいは下記にお願いいたします。
ジェービーエス製薬 お客様相談室
電 話 045-593-2136
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



ジェービーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22