

切り口

4 987438 865141

切り口

開封後はチャックを閉めて保管してください。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

JPS

販売名：ヨクイニンエキス錠N

生薬製剤 第3類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください〔皮膚〕発疹・発赤、かゆみ〔消化器〕胃部不快感
3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 いぼ、皮膚のあれ

用法・用量 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。成人(15才以上)1回4錠、7才以上15才未満 1回3錠、5才以上7才未満 1回2錠、5才未満 服用しないこと (用法・用量に関連する注意) (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2) 食間とは食後2~3時間を指します。

成分・分量 12錠中 ヨクイニンエキス2.0g〔日局ヨクイニン 11.8g に相当〕 添加物:無水ケイ酸、CMC-Ca、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、乳糖水和物

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 本剤は天然物のヨクイニンから抽出したエキスを使用していますので、錠剤の色調が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。(5) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(上段)使用期限(西暦年、月)/(下段)製造番号



T1-21071

ジェービーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎045-593-2136

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

