

漢方製剤  
桂輝湯顆粒

桂輝湯は虚弱な方のねあせやあせも、湿疹・皮膚炎を改善する働きがあります。肌が弱い方、汗をかきやすい方に適しています。

本剤は漢方処方である桂枝加黄耆湯の生薬を抽出し、乾燥エキスとした後、服用しやすい顆粒剤としました。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

むくみ

(6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効能・効果〕

体力虚弱なものの次の諸症：ねあせ、あせも、湿疹・皮膚炎

## 〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15才以上）	1 包	3 回
7 才以上15才未満	2/3包	
4 才以上 7 才未満	1/2包	
2 才以上 4 才未満	1/3包	
2 才未満	1/4包	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3) 食間とは食後2～3時間を指します。

## 〔成分・分量〕

3包(6.0g)中

桂枝加黄耆湯乾燥エキス散4.48gを含有しています。

日局ケ イ ヒ …… 3.2 g	日局シャクヤク …… 3.2 g
日局タ イ ソ ウ …… 3.2 g	日局ショウキョウ …… 0.8 g
日局カ ン ソ ウ …… 1.6 g	日局オ ウ ギ …… 2.4 g

上記生薬量に相当します

添加物として、無水ケイ酸、乳糖水和物、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸Mgを含有しています。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は吸湿しやすいので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。(開封状態で置いておくと顆粒が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。)
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なる場合がありますが、効能・効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
あるいは下記にお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

電 話 045-593-2136

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22