



4 987438 869545

切り口

切り口

開封後はチャックを閉めて保管してください。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

JPS

販売名：JPS続命湯エキス錠N

漢方製剤

第2類医薬品



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 **2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください** [皮膚] 発疹・発赤、かゆみ [消化器] 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。[偽アルドステロン症、ミオパチー] 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。**3. 1ヵ月位(頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください** **4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

効能・効果 体力中等度以上のものの次の諸症:しびれ、筋力低下、高血圧に伴う症状(めまい、耳鳴り、肩こり、頭痛、頭重、頭部圧迫感)、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛、関節のはれや痛み、頭痛、むくみ

用法・用量 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。成人(15才以上) 1回3錠、7才以上15才未満 1回2錠、5才以上7才未満 1回1錠、5才未満 服用しないこと (用法・用量に関する注意)(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2) 食間とは食後2~3時間を持します。

成分・分量 9錠中 続命湯乾燥エキス2.1g [日局キヨウニン 2.0g、日局マオウ 1.5g、日局ケイヒ 1.5g、日局ニンジン 1.5g、日局トウキ 1.5g、日局センキュウ 1.0g、日局カンキョウ 1.0g、日局カンゾウ 1.0g、日局セッコウ 3.0g に相当] 添加物:無水ケイ酸、ケイ酸AI、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、タルク、トウモロコシデンプン

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果にはかわりありません。(5) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(上段) 使用期限(西暦年、月)/(下段) 製造番号

T1-2017



ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎ 045-593-2136

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

