

6 (1日3回)
日分
成人用量として



切り取り線



▼ 開封後はチャックを閉めて保管してください。

ストレスでイライラし、眠れない方に



- ストレスでイライラする、気分が鎮まらず落ち着かない方の不眠におすすめです。
- 夜間の歯ぎしりにもおすすめです。
- お子様の夜泣き、更年期障害にも適しています。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

漢方製剤

第2類医薬品

販売名：JPS抑肝散加陳皮半夏エキス錠N

MADE IN JAPAN

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸の弱い人。(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位 (小児夜泣きに服用する場合には1週間位) 服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱く、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、更年期障害、血の道症、歯ぎしり

【効能・効果に関連する注意】 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 食間とは食後2～3時間を指します。

【成分・分量】 12錠中 抑肝散加陳皮半夏エキス(1/2量) 2.55gを含有しています。

(トウキ 1.5g、チョウトウコウ 1.5g、センキュウ 1.5g、ビャクジュツ 2.0g、ブクリョウ 2.0g、サイコ 1.0g、カンゾウ 0.75g、チンピ 1.5g、ハンゲ 2.5gより抽出)

添加物：無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 本剤は生薬を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。(5) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(上段)使用期限(西暦年、月)/(下段)製造番号

製 造
販売元

ジェービーエス製薬株式会社

栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

お客様相談室 ☎ 045-593-2136

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

