

服用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

かぜ薬

かぜによる発熱・せき・鼻づまりの緩和に

第2類医薬品

スパーク® 21G

スパーク21Gは、洋薬に5種類の生薬と胃粘膜保護成分を配合し、のどの痛み、発熱、せき、鼻水等のかぜの諸症状にすぐれた効果をあらわす胃にやさしいかぜ薬です。

⚠ 使用上の注意**☒ [してはいけないこと]**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気等があらわれることがあります)

4. 服用前後は飲酒しないで下さい**5. 長期連用しないで下さい****☒ [相談すること]****1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい**

(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人

(2)妊娠又は妊娠していると思われる人

(3)授乳中の人は

(4)高齢者

(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(6)次の症状のある人：高熱、排尿困難

(7)次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---|---|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (ステーキンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなプツツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| * 薬剤性過敏症 症候群 | 皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腎障害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜんそく | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい 口のかわき、眠気
- 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法用量】

次の量を食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用して下さい。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15才以上) | 2カプセル | 3回 |
| 7才以上15才未満 | 1カプセル | |
| 7才未満 | 服用しないこと | |

<用法用量に関する注意>

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3)カプセルの取り出しが

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの
凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、
取り出してお飲み下さい。（誤ってそのまま飲み
込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事
故につながります。）



取り出し時には
けがにご注意下さい

【成分分量】

6カプセル(成人1日量)中

| | |
|---|-------|
| ゴオウ | 4.5mg |
| 地竜乾燥エキス | 90mg |
| ケイヒ乾燥エキス | 33mg |
| カンゾウエキス末 | 96mg |
| セネカ乾燥エキス | 36mg |
| アセトアミノフェン | 690mg |
| クロペラスチン塩酸塩 | 48mg |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 60mg |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 7.5mg |
| 無水カフェイン | 75mg |
| メタケイ酸アルミニン酸マグネシウム | 420mg |
| 添加物として乳糖、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸Na、青色1号、赤色2号、黄色5号を含有します。 | |

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)表示の期限内に服用して下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電話 : (0748) 88-3180 (大代表)

受付時間 : 9時から17時まで (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879