

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

目薬

第2類医薬品

パソコン・メール・ドライブなどによる
目の疲れ・眼病予防に

新ラスター®目薬RV

パソコン・携帯電話でのメール交換や車の運転等で、目を使う
機会はとて多くなっています。

このようなとき、「新ラスター目薬RV」の有効成分が目栄養を
補給し、目の疲れ・眼病予防にすぐれた効果を発揮します。

1. 目の疲れ・かすみを改善します。

視神経に作用するビタミンB₁₂と目の
新陳代謝を促進するビタミンB₆が、
目の働きを活発にし、目の疲れ等を
効果的に改善します。

2. 眼病を予防します。

2種類のビタミンとタウリンが目栄養を
与え、衰えた目の機能回復を助け、
眼病を予防します。

3. 爽やかなさごこちです。

疲れた目に爽やかな清涼感を与える
ピンクの目薬です。



使用上の注意



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って 医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなりません

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (6)点眼用にのみ使用して下さい。



【成分分量】

100mL中

成 分	分 量	作 用
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により、結膜充血を取り去ります。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	10mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血をやわらげます。
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	10mg	視神経の働きを整え、目の疲れ等に効果があります。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	100mg	目の新陳代謝を促進し、目の疲れや眼病予防に効果的に働きます。
タウリン	300mg	傷ついた目の組織修復を助け、眼病を予防します。
コンドロイチン硫酸 ナトリウム	300mg	目の乾燥を防ぎ、眼病を予防します。

添加物として l-メントール、d-ボルネオール、ゲラニオール、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、パラベン、プロピレングリコールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の期限内にご使用下さい。



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電 話：(0748) 88-3180 (大代表)

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879