



胸やけ・胃痛・食欲不振に

新・ウイサン[®]胃腸薬N

生活環境の複雑化に起因する不規則な食生活、精神的・肉体的疲労、ストレスなどによって、胃腸の不調、機能の衰えなどが起こりがちです。

新・ウイサン胃腸薬Nは、制酸剤と健胃生薬をそれぞれ3種、さらに胃粘膜保護剤を2種配合することにより、胸やけ、胃痛、食欲不振、飲み過ぎ、食べ過ぎなどにすぐれた効果を発揮する、胃にさわやかな緑の胃ぐすりです。



使用上の注意



【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないで下さい



■【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 次の診断を受けた人
腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
2週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
便秘、下痢

【効能効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)

【用法用量】

次の量を1日3回食後に服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1 包	3 回
11才以上15才未満	2 / 3 包	
8 才以上11才未満	1 / 2 包	
5 才以上 8 才未満	1 / 3 包	
3 才以上 5 才未満	1 / 4 包	
3才未満	服用しないこと	

(1)用法用量をお守り下さい。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【成分分量】

3包(成人1日量)中

成 分	分 量	作 用
ケイ酸アルミン酸 マグネシウム	1000mg	持続性のある制酸剤と速効性のある制酸剤の組合せにより、出すぎた胃酸をすばやく中和し、その効果が持続します。
炭酸水素ナトリウム	700mg	
沈降炭酸カルシウム	500mg	
センブリ末	5mg	芳香、苦味健胃剤として胃の働きを活発にし、食欲不振や消化不良に効果をあらわします。
ケイヒ油	12mg	
チョウジ油	9mg	
アルジオキサ	66mg	荒れた胃粘膜を修復・保護します。
グリチルリチン酸 ニカリウム	45mg	

添加物としてL-メントール、ポビドン、ケイ酸Ca、トウモロコシデンプン、銅クロロフィリンNaを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5)配置期限の過ぎた商品は服用しないで下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電 話：(0748) 88-3180 (大代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元
滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879

®登録商標
05JUL35