この説明文書は，お薬とともに保管し，服用の際には，よくお読みください。

のどのはれ，のどの痛み，口内炎に

第3類医薬品

口腔・咽喉用薬

ペラック®T錠

トラネキサム酸配合

特　徴

ペラックT錠は，炎症やアレルギーを抑える作用のあるトラネキサム酸，カンゾウ乾燥エキスの他に，タンパク質や脂質の代謝に関与し，皮膚や粘膜の機能を正常に働かせるビタミンB_2，ビタミンB_6と体力消耗に効果のあるビタミンCの3種のビタミンを配合した薬です。

空気の乾燥・汚れやかぜなどからくるのどの炎症である咽頭炎・扁桃炎（のどのはれ，のどの痛み）および口内の炎症である口内炎によく効き，7歳の小児から成人まで服用できる薬です。

●トラネキサム酸配合

炎症やアレルギーを抑える作用のあるトラネキサム酸を，1日量あたり750mg配合しています。

●のどのはれ，のどの痛みにすぐれた効果

トラネキサム酸とカンゾウ乾燥エキスの2つの成分が有効に作用して，口内およびのどの炎症を抑えます。

●眠くならない医薬品

抗ヒスタミン薬を配合していませんので，眠くなりません。

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり，副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は，次のいずれの医薬品も服用しないこと

（1）甘草（カンゾウ）またはその主成分グリチルリチンを含有する内服薬
（むくみ，血圧上昇および筋疾患（ミオパシー）等が起こることがある。）

（2）他のアレルギー用薬，トラネキサム酸を含有する内服薬
（鼻炎用薬，かぜ薬，解熱鎮痛薬，鎮咳去痰薬）

2. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

（1）医師または歯科医師の治療を受けている人。
（2）妊婦または妊娠していると思われる人。
（3）高齢者。
（4）本人または家族がアレルギー体質の人。
（5）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（6）次の症状のある人。
むくみ
（7）次の診断を受けた人。
高血圧，心臓病，腎臓病，血栓のある人（脳血栓，心筋梗塞，血栓静脈炎等），血栓症を起こすおそれのある人

2. 次の場合は，直ちに服用を中止し，この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること

（1）服用後，次の症状があらわれた場合

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤，かゆみ
消化器	悪心・嘔吐，胸やけ，食欲不振もしくは食欲増進，胃部不快感
精神神経系	めまい
その他	頻尿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症	尿量が減少する，顔や手足がむくむ，まぶたが重くなる，手がこわばる，血圧が高くなる，頭痛等があらわれる。

（2）5～6日間服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので，このような症状の継続または増強が見られた場合には，服用を中止し，医師または薬剤師に相談すること

下痢

効能・効果

咽頭炎・扁桃炎（のどのはれ，のどの痛み），口内炎

用法・用量

次の量を水またはお湯で服用する。

年　齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	3回（朝昼晩）
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

（1）用法・用量を厳守すること。
（2）食前・食後，いずれの服用でもかまわない。
（3）小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させること。
（4）錠剤の取り出し方：右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り，取り出して服用すること。
（誤ってそのまま飲み込んだりすると，食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。）

〈錠剤の取り出し図〉



成分・分量

成人1日量（6錠）中

成　分	分　量	はたらき
トラネキサム酸	750mg	炎症やアレルギー症状が起こっているとき，体内で異常増加している酵素（プラスミン）を抑え，口内やのどにおけるはれ，痛みなどの症状を改善する。
カンゾウ乾燥エキス	198mg（原生薬として990mg）	生薬，甘草のエキスで，主成分のグリチルリチン酸は，炎症やアレルギーを抑える作用がある。
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB_6）	50mg	皮膚や粘膜の機能を正常に働かせる作用がある。
リボフラビン（ビタミンB_2）	12mg	
L-アスコルビン酸ナトリウム（ビタミンCナトリウム）	500mg	体力消耗に効果がある。

添加物：セルロース，無水ケイ酸，ポリビニルアルコール（部分けん化物），トウモロコシデンプン，ステアリン酸Mg，ヒプロメロース，酸化チタン，タルク，プロピレングリコール，ジメチルポリシロキサン，二酸化ケイ素，黄色三二酸化鉄，カルナウバロウ

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤に配合されているリボフラビン（ビタミンB_2）により，尿が黄色になることがある。

保管および取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
（2）小児の手の届かない所に保管すること。
（3）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
（4）本剤の使用期限は外装に記載してあるので，使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また，一度開封した後は，品質保持の点から開封後より6か月以内に服用すること。
（5）箱の「開封年月日」記入欄に，開封した日付を記入すること。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社　お客様相談室
〒103−8541　東京都中央区日本橋小網町1−8
電　　話　03（6667）3232
受付時間　9:00〜17:00（土、日、祝日を除く）

http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋小網町1−8
®登録商標

製造販売元
滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879番地