

医薬品

ハイビタン®EC顆粒ハイ

ECB₂B₆ 90包
(1包1.8g)

【成分分量】 3包(成人1日量)中

酢酸d- α -トコフェロール(天然型ビタミンE)..... 300mg
アスコルビン酸(ビタミンC)..... 2000mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂)..... 12mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)..... 50mg
ニコチン酸..... 12mg

添加物としてアスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、エリスリトール、乳糖、酸化チタン、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、ビタミンEを含有します。

●配合成分のリボフラビン酪酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

【用法用量】

成人(15才以上)..... 1回 1包
11才以上15才未満..... 1回 2/3包
7才以上11才未満..... 1回 1/2包
3才以上 7才未満..... 1回 1/3包
1才以上 3才未満..... 1回 1/4包
1日3回、4時間以上の間隔をおいて服用して下さい。

●用法用量に関連する注意

- (1)用法用量をお守り下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5)表示の期限内に服用して下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話: (0748) 88・3180(大代表)
受付時間: 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879

使用期限

製造番号



バンド



箱

服用前に説明書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。



使用上の注意



【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい：医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、胃部不快感

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい：便秘、下痢

【効能効果】

○末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ

○次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい。」

○次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期