

かぜ

のひきはじめに
葛根湯液

眠くなりにくい漢方のかぜ薬

●保管上の注意●

生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないで下さい。

鼻かぜ

肩こり

頭痛

鼻かぜ

肩こり

頭痛



体力中等度以上の方に

かぜ

のひきはじめに

葛根湯液

眠くなりにくい
漢方のかぜ薬

第2類医薬品

朝1日夕

2回
45mL×2本(1日分)



かぜ

のひきはじめに
葛根湯液

第2類医薬品 45mL

鼻かぜ

肩こり

頭痛

製造販売元
滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町湯田2-2-1



4 974042 203131



使用期限

製造番号

10AUG67

第2類医薬品

開け口

45mL×2本
(1日分)

服用前に説明書をよくお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

葛根湯液EX2

△【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ
等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難 (9) 次の
診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこげばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 1ヵ月位 (感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回) 服用しても症状がよくならない場合

3. 長期運用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい

【効能効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 表示の期限内に服用して下さい。

【用法用量】

成人(15才以上) 1回1本、1日2回
朝夕、食前又は食間によく振って
から服用して下さい。

● 用法用量に関連する注意

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
(2) 本品は1回に1本を飲みきり、
分割服用はしないで下さい。

【成分分量】 90mL(45mL×2本)中

葛根湯エキス …………… 4340mg

カッコン ……………	8.0g
マオウ ……………	4.0g
タイソウ ……………	4.0g
ケイヒ ……………	3.0g
シャクヤク ……………	3.0g
カソウ ……………	2.0g
ショウキョウ ……………	1.0g

添加物としてハチミツ、安息香酸
Na、パラベン、ステアリン酸ポリ
オキシリル、香料を含有します。● 配合成分により、沈殿を生じます。
よく振って服用して下さい。● 生薬成分による沈殿物が瓶口に
付着しますので、瓶を横にして
保管しないで下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 ぐすり相談室
電 話：(0748)88-3180(大代表)
受付時間：9時から17時まで
(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町池879

開封年月日

開封時に記入してください。