

漢方処方のかぜ薬

葛根湯エキス顆粒WS-R

⚠ 使用上の注意

❌ 【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい：生後3ヵ月未満の乳児
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないで下さい



【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
(4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の著しい人
(6) 高齢者
(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

かぜの初期症状、鼻かぜ又はかぜによる頭痛若しくは肩こり

【用法用量】

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成 人 (15才以上)	1 包 	3 回
7 才 以 上 15 才 未 満	2 / 3 包 	
4 才 以 上 7 才 未 満	1 / 2 包 	
2 才 以 上 4 才 未 満	1 / 3 包 	
2 才 未 満	1 / 4 包 	

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
 - (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
 - (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用して下さい。
- 「食間」とは食事と食事の間のこと、食後2～3時間経過したところをさします。

【成分分量】

3包 (成人1日量) 中


葛根湯エキス (4/5量) -----3483mg

カッコン -----	6.46g	マオウ -----	3.23g
タイソウ -----	3.23g	ケイヒ -----	2.42g
シャクヤク -----	2.42g	カンゾウ -----	1.62g
ショウキョウ -----	0.81g		

添加物としてマクロゴール、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の期限内に服用して下さい。



■お問い合わせ先
 滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
 電 話：(0748) 88-3180 (大代表)
 受付時間：9時から17時まで
 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 (独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋 賀 県 甲 賀 市 甲 賀 町 滝 8 7 9