

服用前に箱側面の説明書きを必ずお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

第2類医薬品 葛根湯エキス顆粒WS-R

【効能効果】 体力中等度以上のものの次の諸症：
感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、
鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法用量】

成人(15才以上)	1回 1 包
7才以上15才未満	1回 2/3包
4才以上 7 才未満	1回 1/2包
2才以上 4 才未満	1回 1/3包
2才未満	1回 1/4包

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用
して下さい。●食間とは食後2～3時間をさします。

＜用法用量に関連する注意＞

(1)用法用量を厳守して下さい。(2)小児に服用
させる場合には、保護者の指導監督のもとに服
用させて下さい。(3)1才未満の乳児には、医師
の診療を受けさせることを優先し、止むを得な
い場合にのみ服用させて下さい。

【成分分量】 3包（成人1日量）中

葛根湯エキス（4/5量）..... 3483mg

カッコン6.46g、マオウ3.23g、タイソウ3.23g、
ケイヒ2.42g、シャクヤク2.42g、カンゾウ1.62g、
ショウキョウ0.81g

添加物としてマクロゴール、ステアリン酸Mg、ケイ
酸Ca、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有
します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に
保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管
して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)1包
を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り
返して保管し、2日以内に服用して下さい。(5)表示
の期限内に服用して下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電 話：(0748) 88-3180（大代表）

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

製造販売元

滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879

⚠️【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないで下さい 生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)むくみ、排尿困難の症状のある人(9)高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

20260825