

目薬

第2類医薬品

目の疲れ・結膜充血に

パームFX[®]

パソコン、スマートフォン、テレビ等による目の酷使が原因で、目の疲れや目の充血といった不快な症状が起きます。このような時、強い清涼感があり、スキッとクールなさし心地の目薬「パームFX」が目の充血を抑え酷使した目に爽快感を与えます。



使用上の注意



【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3)次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - (4)次の診断を受けた人
緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1)目のかすみ改善されない場合
 - (2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (4)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (6)点眼用にのみ使用して下さい。



容器の先が目やまつ毛に触れないようにして下さい。

【成分分量】


100mL中

成 分	分 量	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により、結膜充血を取り去ります。
ネオスチグミン メチル硫酸塩	5mg	ピント調節機能改善作用により、目の疲れを改善します。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	15mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血を和らげます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	100mg	目の新陳代謝を促進し、目の疲れや眼病予防に効果的に働きます。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	300mg	目の乾燥を防ぎ、眼病を予防します。

添加物として *l*-メントール、*d*-ボルネオール、グラニオール、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、クロロブタノール、パラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の期限内にご使用下さい。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用下さい。



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電 話：(0748) 88-3180 (大代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879