

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

“急性鼻炎、アレルギー性鼻炎等の諸症状の緩和に”

# スットワン鼻炎

第②類医薬品

塩酸プソイドエフェドリン (PSE) 配合鼻炎用内服薬

## 特徴

鼻炎には鼻かぜといわれる急性鼻炎、季節の変わりめ、ハウスダスト、花粉等が原因となつて起こるアレルギー性鼻炎といったいくつかのタイプがあり、これらによるくしゃみ、鼻みず、鼻づまり等の症状は不快なものです。鼻にきたら早めの手当てが大切です。スットワン鼻炎は、塩酸プソイドエフェドリン (PSE)、リゾチーム塩酸塩を含む5種の有効成分がすぐれた効果を発揮し、この様な諸症状を緩和します。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

#### 1. 次の人は服用しないこと。

- (1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。(眠気があらわれることがある。)

#### 4. 長期連用しないこと。

## 🗨 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。緑内障
- (9) モノアミン酸化酵素阻害剤(塩酸セレギリン等)で治療を受けている人。

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

##### (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 悪心・嘔吐、食欲不振  |
| 精神神経系 | めまい、不眠、神経過敏 |
| その他   | 排尿困難        |

まれに裏面の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

(裏面に続く)

| 症状の名称                                                    | 症 状                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                       | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブンス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死症<br>(ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。           |

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。口のかわき

## 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

## 用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年 齢   | 15才以上  | 15才未満   |
|-------|--------|---------|
| 1 回 量 | 1 カプセル | 服用しないこと |
| 服用回数  | 1日3回   |         |

### 【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

## 成分・分量 1日量(3カプセル中)

| 成 分               | 分 量      | 成 分             | 分 量  |
|-------------------|----------|-----------------|------|
| リゾチーム塩酸塩          | 48mg(力価) | クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 7mg  |
| 塩酸プソイドエフェドリン(PSE) | 120mg    | d1-メチルエフェドリン塩酸塩 | 60mg |
| 無水カフェイン           | 100mg    |                 |      |

添加物として、乳糖水和物、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、クエン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウム、マクロゴールを含む。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

至誠堂製薬株式会社 TEL.0745(62)5555

受付時間 10:30～15:00(土、日、祝日を除く)

お客様相談室へ

