

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

“ビタミンCの補給に”

(ビタミンC主薬製剤)

ビルタミンC-2000

医薬品

ビタミンC(アスコルビン酸)は、結合組織の主成分であるコラーゲンの生成・維持に関与し、毛細血管を丈夫にしたり、皮ふのメラニン形成に関与し、色素沈着をおさえたりする生理的・薬理的に重要な働きをする大切なビタミンです。人は体内でつくることが出来ないの、食品又は医薬品から摂取することが必要です。ビルタミンC-2000は3包でビタミンCを2000mg摂取できる顆粒のビタミンC製剤です。

働 き

1. 筋肉疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時や老年期のビタミンCの補給に役立ちます。
2. 皮ふのメラニン色素に働いて、しみ、そばかす、日やけによる色素沈着の緩和に効果をあらわします。
3. 細胞と細胞をつなぐコラーゲンの生成に関与して、血管壁を丈夫にし、歯ぐきからの出血や鼻出血に効果をあらわします。

特 徴

1. しみ、そばかすなどの緩和に必要な主成分のビタミンCに皮膚に関連するビタミンB₂を配合しています。
2. ビタミンC2000mgが3包で摂取できます。
3. 甘酸っぱくてのみやすい。
4. 低カロリーです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 次の診断を受けた人。 フェニルケトン尿症
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐
 - (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。 下痢

効能・効果

- 次の諸症状の緩和
 - しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防
 - 歯ぐきからの出血、鼻出血
 - 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。」
- 次の場合のビタミンCの補給
 - 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

(裏面に続く)

用法・用量

次の量を食後又は食間に服用します。

年 齢	15才以上	11才以上 15才未満	7才以上 11才未満	3才以上 7才未満	1才以上 3才未満	1才未満 服用しない こと
1 回 量	1 包	2 / 3 包	1 / 2 包	1 / 3 包	1 / 4 包	
服用回数	1日3回					

【用法・用量に関連する注意】

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用してください。

成分・分量 3包(1包1.5g×3)

成 分	分 量	作 用
ビタミンCとして 〔アスコルビン酸 L-アスコルビン酸ナトリウム (アスコルビン酸として1000mg)〕	2000mg 〔1000mg 1124.79mg〕	日やけや、しみなどの色素の沈着を緩和し、血管壁を丈夫にし、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。
リボフラビン (ビタミンB ₂)	9mg	皮ふや粘膜の働きを整えて、肌を健康に保ちます。

添加物として、D-マンニット、乳糖、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)を含む。

【成分に関連する注意】

1. 本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン(ビタミンB₂)によるものですから心配ありません。
2. 本剤は尿及び大便検査値に影響を及ぼすことがありますので、尿及び大便の検査を受ける場合は、本剤の服用を医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
5. 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

至誠堂製薬株式会社 TEL.0745(62)5555

受付時間 10:30~15:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



至誠堂製薬株式会社

〒639-2241 奈良県御所市茅原220-1

BR-1