

使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

デリケートな部分のかゆみ、かぶれに

フィーメリナ[®]

第2類医薬品 鎮痒消炎剤

製品特長

- (1) 5つの有効成分(抗ヒスタミン剤：ジフェンヒドラミン、局所麻酔剤：リドカイン、抗炎症剤：グリチルレチン酸、血流改善剤：トコフェロール酢酸エステル、殺菌剤：イソプロピルメチルフェノール)をバランスよく配合した鎮痒消炎剤です。
- (2) デリケートな部分にも安心して使用できる低刺激性のクリームです。
- (3) 親水性のクリームですので、のびがよく、べとつきません。

本剤にステロイド成分は配合されておりません。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 湿潤やただれのひどい人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合

【効能・効果】

かゆみ、かぶれ、湿疹、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、虫さされ、しもやけ

カンジダ症、トリコモナス症等の原因によるかゆみは本剤で治療できません。医師による治療が必要になります。

(裏面もご覧ください。)

【用法・用量】

1 日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量】（100g中）

成 分	分量	は た ら き
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみを鎮めます。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用でかゆみを和らげます。
グリチルレチン酸	0.5g	患部の炎症を鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用で、雑菌の繁殖を抑えます。

添加物として、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ミリスチン酸オクチルドデシル、イソステアリン酸、ステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、1,3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、エデト酸ナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸メチルを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限（ケース及びチューブに表示）を過ぎた製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室
TEL：076-435-0878

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【製造販売元】新新薬品工業株式会社 〒930-2221 富山県富山市今市324番地
N・8H