

皮膚炎、湿疹、かぶれに

第②類医薬品

メディストロ軟膏

皮膚疾患治療薬

メディストロ軟膏は、有効性と副作用低減の両立を目的に開発されたプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルを配合した鎮痒消炎薬です。プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルは患部で優れた効果を示し、体内に吸収されると作用の弱い物質に分解することで副作用が低減されるよう設計された、アンテドラッグといわれる新しいタイプのステロイド剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の部位には、使用しないでください。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ (患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、 持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんま疹

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5)本剤を塗擦後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】 (1g中)

成 分	分量	は た ら き
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg	抗炎症作用により皮膚炎、湿疹、かぶれ等の症状を抑えます。
クロタミトン	50mg	患部のかゆみを鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	殺菌作用により、患部の化膿を防ぎます。

添加物として、中鎖脂肪酸トリグリセリド、マイクロクリスタリンワックス、白色ワセリンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限(ケース及びチューブに表示)を過ぎた製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室

TEL : 076-435-0878

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度と問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931

【製造販売元】新新薬品工業株式会社 〒930-2221 富山県富山市今市324番地