

2024年12月改訂
(記載整備)

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

湿疹、かぶれ、皮膚炎に

デルマレチゾン[®]PVクリーム

第2類医薬品 鎮痒消炎薬

デルマレチゾンPVクリームは、患部でしっかり効いたあと、体内に吸収されると活性の低い物質になるアンテドラッグ型のプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルを配合した鎮痒消炎薬です。有効性と安全性のバランスにすぐれた特性をもっています。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の部位には使用しないでください。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
- 顔面には、広範囲に使用しないでください。
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4)患部が広範囲の人
(5)湿潤やただれのひどい人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(裏面もご覧ください)

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんま疹

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5)本剤を塗擦後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】 (100g中)

成 分	分量	は た ら き
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.15 g	抗炎症作用により湿疹、かぶれ、皮膚炎等の症状を抑えます。
クロタミトン	5 g	患部のかゆみを和らげます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5 g	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌作用により、雑菌の繁殖を防ぎます。

添加物として、モノステアリン酸バチル、白色ワセリン、軽質流動パラフィン、オクチルドデカノール、セタノール、プロピレングリコール、モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、カルボキシビニルポリマー、パラオキシ安息香酸メチル、エデト酸ナトリウム水和物、ジイソプロパノールアミンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限(ケース及びチューブに表示)を過ぎた製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】

新新薬品工業株式会社 お客様相談室
TEL : 076-435-0878

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【製造販売元】新新薬品工業株式会社 富山県富山市今市324番地