

鎮咳去痰薬

第2類医薬品

鎮咳去痰薬

コバドリン[®]A錠
KOBADRIN[®]A Tab.

セキは気管に入った異物や老廃物を、タンとして体外に排出する作用を助けますが、セキはジェット機にたとえられるほど呼吸が激しいので、エネルギーをひどく消耗し、ただでさえ衰弱している患者の体力を一層衰えさせます。また就寝時のセキは不眠の原因となります。

従って、セキを伴う諸種の病気の治療に際しては、まず適切な鎮咳・去痰薬の服用がたいせつです。

コバドリンA錠は、苦しい咳を鎮め、タンを切るのに必要な薬剤を適正量配合した淡黄色の錠剤です。

**使用上の注意****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬
2. 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
4. 過量服用・長期連用しないでください。※

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
(7) 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

便秘、口のかわき

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

下記の量を食後水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	2錠	3回
8歳以上15歳未満	1錠	3回
8歳未満	服用しないこと	

（用法・用量に関連する注意）

・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

・錠剤の取り出し方

PTP包装の製品は、右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



【成分と働き】

6錠中に次の成分を含んでいます。

成 分	6錠中	作 用
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支筋のけいれんをおさえ、せきをしずめます。
ジヒドロコデインリン酸塩	21mg	せきをおさえます。
グアイフェネシン	300mg	たんを排出しやすくします。
ジフェンヒドラミンサリチル酸塩	81mg	アレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	150mg	心臓の負担を軽くします。
カンゾウ末	300mg	鎮咳、去痰作用があります。

添加物としてヒドロキシプロピルスターチ、ケイ酸アルミニウム、セルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
4. 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

この製品をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口 新新薬品工業株式会社 CHC事業部
富山県富山市今市324番地
電話番号 076-435-0878
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元 新新薬品工業株式会社
富山県富山市今市324番地