

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かゆい水虫・たむしに1日1回で効く ビルモン[®]TF液 EX

第2類医薬品 水虫治療剤

製品特長

- (1) テルピナフィン塩酸塩の優れた殺真菌作用と角質浸透性により、1日1回の塗布で水虫・たむしに優れた効果を発揮します。
- (2) かゆみ止め成分（ジフェンヒドラミン塩酸塩）と局所麻酔成分（リドカイン）が素早くかゆみを鎮めます。
- (3) グリチルレチン酸が患部の炎症を抑えます。
- (4) イソプロピルメチルフェノールの殺菌作用で雑菌の繁殖を抑えます。
- (5) 乾きやすく、サラッとした使用感の液剤で、カサカサした患部に適しています。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください。
本剤による過敏症（例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等）を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等
(2) 湿疹
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 乳幼児
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(4) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人
（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6) 患部が顔面又は広範囲の人
(7) 患部が化膿している人
(8) 妊婦又は妊娠している可能性のある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かぶれ、かゆみ、はれ、刺激感、熱感、 ^{りんせつ} 鱗屑・ ^{らくせつ} 落屑（フケ、アカのような皮ふのはがれ）、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮ふの亀裂

- (2) 2週間位使用しても症状が良くならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合

®登録商標

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

（裏面もご覧ください。）


【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。

＜液容器の使い方＞



- 患部やその周囲を清潔にして塗布してください。
- 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で押して中の空気を抜いてください。(暑い時期、温度の高い場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに内圧が高まり、薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)
- 患部に使用する時は容器を下向き又は斜めにして、患部に先端を軽く押しあてて塗布してください。(先端を患部からはなすと、薬液がでなくなります。)

【成分・分量】(100g中)

成 分	分量	は た ら き
テルピナフィン塩酸塩	1.0 g	殺真菌作用で白癬菌(水虫菌)を殺菌します。
リドカイン	2.0 g	局所麻酔作用でかゆみを和らげます。
グリチルレチン酸	0.5 g	患部の炎症を抑えます。
ジフェニヒドラミン塩酸塩	0.5 g	かゆみを鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.3 g	殺菌作用で雑菌の繁殖を抑えます。

添加物として、ラウロマクロゴール、マクロゴール、エタノール、乳酸を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限(ケース及び容器に表示)を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) 使用済み容器は火中に投じないでください。
- (7) 本剤は合成樹脂(スチロール等)を軟化したり塗料をとくしたりすることがあるので、床や家具等につかないようにしてください。

水虫治療のポイント

1. 清潔 患部も衣類(靴下)もこまめに洗って清潔にしてください。
2. 乾燥 患部の乾燥を心がけてください。
3. 根気 かゆみなどの症状がなくなった後も、約1ヶ月は根気よく治療を続けてください。

【お問い合わせ先】

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室
電話番号 076-435-0878
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【製造販売元】新新薬品工業株式会社 〒930-2221 富山県富山市今市324番地