

この説明書は、ご使用前によくお読みください。
なお、必要な時に読めるように大切に保管してください。

1日1回型 みずむし・たむし治療外用剤

第2類医薬品

アトレチオンLX **アトレチオンLXクリーム**

速乾性液剤

べたつかないゲルタイプ

アトレチオンLXスプレー

速乾性

特 長

多忙な現代人の生活にピッタリの1日1回塗布タイプに、かゆみと炎症を抑える成分をプラスしました。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

守らないと症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
- (2)湿疹
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の方は使用の前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている方
- (2)乳幼児
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の方
- (4)今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある方
- (5)患部が広範囲の方
- (6)患部が化膿している方
- (7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない方(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1)使用後、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、ただれ等の症状があらわれた場合
- (2)2週間位使用しても症状の改善がみられない場合や、本剤の使用により症状が悪化(病巣が使用前より広がる等)した場合

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

アトレチオンLX・アトレチオンLXクリーム：

患部を清潔にして、1日1回、適量を患部に塗布してください。

アトレチオンLXスプレー：

患部を清潔にして、1日1回、適量を患部に噴射塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

(2)目に入らないようにご注意ください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。

(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(4)外用にのみ使用し、内服しないでください。

(5)患部まで2～3cmの距離で噴射してください(スプレー)。

(6)定められた用法、用量を厳守してください。

【成分・分量】 1mL又は1g中

成分名	分量	作用等
ピホナゾール	10mg	1日1回で、みずむし菌を殺します。
リドカイン	20mg	かゆみ、痛みを即座に抑えます。
クロタミトン	50mg	かゆみを持続的に抑えます。
グリチルレチン酸	5mg	炎症を抑えます。
l-メントール	20mg	スツとする使用感。

添加物：(アトレチオンLX・アトレチオンLXスプレー)

ミリスチン酸イソプロピル、マクロゴール、水酸化Na、塩酸、八アセチル
しょ糖、エタノール

(アトレチオンLXクリーム)

ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、パラベン、
カルボキシビニルポリマー、グリセリン、水酸化Na、塩酸

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)小児の手の届かない所に保管してください。

(2)直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。

(3)誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

(4)火気に近づけないでください(アトレチオンLX・アトレチオンLXスプレー)。

(5)使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

みずむし治療のポイント

1.清潔 患部も衣類(靴下)もこまめに洗い清潔に。

2.乾燥 靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通し良く、よく乾燥。

3.根気 風呂あがりの薬剤治療、痒くなくても1シーズン。

本品についてお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。[受付時間9：00～17：00(土、日及び祝日を除く)]

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号076-472-0361

〒930-0344 富山県中新川郡上市町森元町7-2