

この説明書は、ご使用前によくお読みください。
 なお、必要な時に読めるように大切に保管してください。

一日一回型 みずむし・たむし治療外用剤

トライククリーム

特長

みずむしやたむしは白癬菌というカビの1種が原因となる皮膚病で、一般にたまらないかゆみを伴います。白癬菌は高温多湿を好み、薬剤の浸透しにくい皮膚表面の角質層を棲家とするため根治し難く、再発し易い疾患です。

本剤は、白癬菌などに対して長い時間にわたって殺菌効果を示すビホナゾールを配合しているため、通常一日一回の塗布により効果をあらわし、さらに、たまらないかゆみを抑える4つの成分をプラスした、多忙な現代人の生活にピッタリの、みずむし・たむし治療剤です。基剤には、サラッとしてベタつきの少ない親水性基剤を採用しています。

△使用上の注意

してはいけないこと ☒

守らないと症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。
 次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、顔面、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等
- (2)湿疹
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

相談すること

1. 次の方は使用の前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている方
- (2)乳幼児
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の方
- (4)今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある方
- (5)患部が広範囲の方
- (6)患部が化膿している方
- (7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない方

（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い）

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、ただれ

- (2)2週間位使用しても症状の改善がみられない場合や、本剤の使用により症状が悪化（病巣が使用前より広がる等）した場合



[効能・効果]

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

[用法・用量]

患部を清潔にして、一日一回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないようにご注意ください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5)定められた用法、用量を厳守してください。

[成分・分量] 1 g 中

成分名	分量	作用等
ビホナゾール	10mg	一日一回で、みずむし菌を殺します。
リドカイン	20mg	かゆみ、痛みを即座に抑えます。
クロタミトン	50mg	かゆみを持続的に抑えます。
グリチルレチン酸	5mg	炎症を抑えます。
1-メントール	20mg	スツとする使用感で、かゆみを軽減します。

添加物：ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、パラベン、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、水酸化Na、塩酸

〈保管及び取り扱い上の注意〉

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限（外箱記載）を過ぎた製品は使用しないでください。



みずむし治療のポイント

1. 清潔 患部も衣類（靴下）もこまめに洗い清潔に。
2. 乾燥 靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通し良く、よく乾燥。
3. 根気 風呂あがりの薬剤治療、痒くなくても1シーズン。

本品についてお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。〔受付時間 9:00～17:00(土、日及び祝日を除く)〕

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号(076)472-0361