

鎮痛 消炎薬

第2類 医薬品

販売名 ロキソアタックLXゲルα

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起したことがある人 (3)15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等 (2)皮膚の弱い部位(顔、わきの下等) (3)しっしん、かぶれ、傷口 (4)みずむし・むし等又はアレルギー性皮膚炎の患部

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。

4. 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診察を受けてください)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人 (4)高齢者 (5)次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がりますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢・軟便

4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性がります)

製品の特徴

- すぐれた鎮痛消炎効果のあるロキソプロフェンナトリウム水和物を配合。
- 清涼感を与えるL-メントールを配合。

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

成分・分量 100g中

成 分	分 量
ロキソプロフェン ナトリウム水和物	1.13g (無水物として1g)
L-メントール	3g

添加物として、カルボキシビニルポリマー、2,2',2"-ニトロロトリエタノール、エタノール、精製水を含有する。

用法・用量

1日3～4回、適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけで使用してください。
- (4)1回あたり5cm(約2g)、1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (5)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (6)外用にのみ使用してください。
- (7)使用後は手を洗ってください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、アルコール類や油脂類等で変質・変色のあるもの(プラスチック製品、化学繊維、皮革、家具、床等)への本剤の付着は避けてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

企画元

株式会社ツルハグループ
マーチャンダイジング

発売元

株式会社大石膏盛堂
佐賀県鳥栖市本町一丁目933番地

本品についてのお問い合わせ
はお買い求めのお店又は
下記にお願いいたします。

製造販売元

新生薬品株式会社

〒930-0364

富山県中新川郡上市町横越16番1

電話番号 (076)472-0361

受付時間 9:00～17:00

(土、日及び祝日は除く)



(内容量)50g

SN1

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)