

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限(底面記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) アルコール類や油脂類などで変質・変色のおそれのあるもの(プラスチック製品、化学繊維、合成樹脂、皮革、家具、床等)への本剤の付着は避けてください。



副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)



4 511574 000434

第2類 医薬品

販売名 ヒフサルフ 外用鎮痛消炎薬

ご使用に際して、この外箱の説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【特徴】

- ① 消炎鎮痛成分フェルピナクが炎症を起こした筋肉や関節に効果を発揮
- ② 〆-メントール6%配合で、爽快感
- ③ 背中、腰などの手の届きにくいところにも塗りやすい容器

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人には使用しないでください。

(1) 今までに本剤に配合の成分によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦または妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜など。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) 化膿している患部。

📞 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。(3) 今までに薬や化粧品などによるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師または薬剤師にご相談ください。

(1) 使用中または使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれなど

(2) 1週間位使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腿鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【成分・分量】 1mL中

フェルピナク……………30mg
〆-メントール……………60mg
クロルフェニラミン
マレイン酸塩 …… 1mg

添加物として、1,3-ブチレングリコール、BHT、エタノール、ハアセチルシト糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ジソプロパノールアミン、水酸化Na、塩酸を含有します。

【用法・用量】

1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

(1) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(2) 外用にのみ使用してください。(3) 塗布部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。

製品についてのお問い合わせはお買い求めのお店、又は下記までお願いいたします。

【受付時間】

9:00～17:00

(土、日及び祝日は除く)

【新生薬品株式会社 消費者相談窓口】

電話番号 076-472-0361

〒930-0344 富山県中新川郡上市町森元町7-2

製造販売元

新生薬品株式会社

富山県中新川郡上市町森元町7-2