



肥満症・便秘

顆粒

防風通聖散

満量処方

第2類医薬品

防風通聖散料エキス 4,500mg

押して開ける

第2類医薬品

販売名:新生防風通聖散顆粒〈満量処方〉

【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬(下剤)
- 2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

■ 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸が弱く下痢しやすい人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
そ の 他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢、便秘。
- 4.1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 5.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの次の諸症:高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

【用法・用量】

次の量を1日3回朝食後、食前又は食間にそのまま水かお湯にて服用する
成人(15歳以上)……1回1包 15歳未満……服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守すること

食間とは食事と食事の間を意味し、食後約2〜3時間のことをいいます。

【成分・分量】

1日量6.0g(2.0g×3包)中	防風通聖散料エキス4.5gを含有
ト ウ キ……1.2g	マ オ ウ……1.2g
シャクヤク……1.2g	ダイ オ ウ……1.5g
センキュウ……1.2g	硫酸ナトリウム……1.5g
サン シ シ……1.2g	ビャクジュツ……2.0g
レンギョウ……1.2g	キ キ ヨウ……2.0g
ハ ッ カ……1.2g	オ ウ ゴ ン……2.0g
ショウキョウ……0.3g	カン ソ ウ……2.0g
ケ イ ガ イ……1.2g	セ ッ コ ウ……2.0g
ハマボウフウ……1.2g	カ ッ セ キ……3.0g

添加物として、ヒプロメロース、ステアリン酸マグネシウム、D-マンニトールを含有する。
本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いた製品ですので、顆粒の色が多少異なることがあります
りますが効能又は効果には変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

副作用被害救済制度

電話:0120-149-931

使用期限

【お問い合わせ先】

新生薬品工業株式会社

電話番号 0744-52-3330

受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)

製造番号

製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269