

押して開ける

第2類医薬品

販売名: 新生防風通聖散顆粒〈満量処方〉

【効能・効果】体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症: 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでももの(にきび)、肥満症

【用法・用量】次の量を1日3回朝昼夕、食前又は食間にそのまま水かお湯にて服用する
成人(15歳以上)……1回1包 15歳未満……服用しないこと

＜用法・用量に関連する注意＞用法・用量を厳守すること

※食間とは食事と食事の間を意味し、食後約2～3時間のことをいいます。

【成分・分量】1日量6.0g(2.0g×3包)中 防風通聖散料エキス4.5gを含有

ト	ウ	キ	……1.2g	ショウ	キョウ	……0.3g	ビヤク	ジュツ	……2.0g
シャク	ヤク	……1.2g	ケイ	ガイ	……1.2g	キ	キョウ	……2.0g	
セン	キュウ	……1.2g	ハマ	ボウフウ	……1.2g	オウ	ゴン	……2.0g	
サン	シシ	……1.2g	マ	オウ	……1.2g	カン	ゾウ	……2.0g	
レン	ギョウ	……1.2g	ダイ	オウ	……1.5g	セツ	コウ	……2.0g	
ハ	ツカ	……1.2g	硫酸ナトリウム	……1.5g	カ	ツセ	キ	……3.0g	

添加物として、ヒプロメロース、ステアリン酸マグネシウム、D-マンニトールを含有する。本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いた製品ですので、顆粒の色が多少異なることがあります。効能又は効果には変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2.小児の手の届かない所に保管してください。3.使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

【使用上の注意】

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬(下剤) 2.授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

■ **相談すること** 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸が弱く下痢しやすい人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢、便秘。
4.1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

使用期限

製造番号

製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269

電話番号:0744-52-3330

受付時間:9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

【ご購入に関するお問い合わせ先】

アインズ&トルペ事務局

0120-50-1068(固定電話・PHSから)

0570-550-168(携帯電話から)

受付時間:9:00～17:00(土、日、祝日を除く)