

体力中等度以上の方の

ひきはじめのかぜ・肩こりに

1日

2回

タイプ

カコナール®

葛根湯

顆粒
2

第2類医薬品

●眠くなる成分を含まない

漢方製剤

特納用

第一三共ヘルスケア

お湯に溶かして服用できます

6包

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人
(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人：
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合は5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

〈用法・用量〉

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	2回
7歳以上15歳未満	2/3包	朝夕、食前又は食間にそのまま水かお湯にて服用して下さい。またはお湯に溶かしてよくかき混ぜた後、温服して下さい。
4歳以上7歳未満	1/2包	
2歳以上4歳未満	1/3包	
2 歳 未 滿		服用しないで下さい。

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)2歳以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

セルフメディケーション

税控除対象

カコナール®

葛根湯顆粒2

第2類医薬品

6包(1.8g×6)



Daiichi-Sankyo

〈成分・分量〉

本剤は淡褐色の顆粒剤で、2包(1包1.8g)中に次の成分を含有しています。

葛根湯エキス(3/4量).....3.3g

下記の生薬の水製抽出エキス

〔カッコン.....6g マオウ.....3g タイソウ.....3g ケイヒ.....2.25g
シャクヤク.....2.25g カンゾウ.....1.5g ショウキョウ.....0.75g〕

添加物:D-マンニトール、アセスルファムカリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg

〈成分・分量に関連する注意〉本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

〈効能・効果〉

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

〈保管及び取扱い上の注意〉

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)1包を分割して残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

お問い合わせ先:お客様相談室

電話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269

(下段)

製造番号(上段)、使用期限(下段)

紙箱
カコナール葛根湯顆粒2
第2類医薬品
MADE IN JAPAN



4 987107 635389