

成分・分量

1日量(3包)中 1包1,200mg
 炭酸水素ナトリウム ……1,200mg
 ガジュツ末 ……100mg
 ケイヒ末 ……260mg
 ロートエキス散 ……300mg
 ウイキョウ末 ……35mg
 チョウジ末 ……30mg
 合成ヒドロタルサイト ……700mg
 ビオチンアスターゼ ……300mg
 添加物:乳糖水和物、パレイシヨデ
 ンブ、ヒドロキシプロピルセル
 ロー、CMC-Ca、カンゾウ末、トメ
 ントール ※矯味剤として「カンゾ
 ウ末」を100mg、芳香剤として「l-メ
 ントール」を10mg配合しています。

保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の
 少ない涼しい所に保管してくださ
 い。(2)小児の手のとどかない所
 に保管してください。(3)他の容
 器に入れかえないでください。(誤
 用の原因になったり品質が変わり
 ます。)(4)分割して残った薬は、
 袋の口を折り曲げて保管し、すみ
 やかに服用するか、廃棄してくだ
 さい。(5)期限を過ぎた製品は服
 用しないでください。

副作用被害救済制度
 0120-149-931

16包 1,400円 (税別)

生薬配合製剤

第2類医薬品

新 トキワ胃腸薬S



消化不良

胃酸過多

胃痛



常盤薬品

NOEVIR GROUP

16包 顆粒

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、
 胃部膨満感、もたれ(胃もた
 れ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(お
 くび)、はきけ(むかつき、胃の
 むかつき、二日酔・悪酔のむかつ
 き、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み
 過ぎ(過飲)、胃痛、消化促進、
 消化不良、食欲不振(食欲減
 退)、食べ過ぎ(過食)、消化
 不良による胃部・腹部膨満感

用法・用量

成人(15才以上) …… 1回1包
 11才以上15才未満 …… 1回2/3包
 8才以上11才未満 …… 1回1/2包
 5才以上8才未満 …… 1回1/3包
 3才以上5才未満 …… 1回1/4包
 3才未満 …… 服用しないでください。

いずれも1日3回食後に服用して
 ください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、
 保護者の指導監督のもとに
 服用させてください。
- (3)水またはぬるま湯で服用して
 ください。

第2類医薬品

新トキワ胃腸薬S

押してあける

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
 副作用が起こりやすくなります)
 1.次の人は服用しないでください 透析
 療法を受けている人。 2.本剤を服用し
 ている間は、次の医薬品を服用しない
 ください 胃腸鎮痛薬 3.授乳中の
 人は本剤を服用しないか、本剤を服用す
 る場合は授乳をさけてください(母乳に
 移行して乳児の脈が速くなることがあ
 ります。) 4.長期連用しないでください

■ 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師または登録
 販売者に相談してください
 (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦
 または妊娠していると思われる人。(3)高
 齢者。(4)薬などによりアレルギー症状を
 起こしたことがある人。(5)次の症状のあ
 る人。排尿困難(6)次の診断を受けた人。
 腎臓病、心臓病、線内障
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副
 作用の可能性があるため、直ちに服用を
 中止し、この箱を持って医師、薬剤師ま
 たは登録販売者に相談してください

発売元

常盤薬品工業株式会社
 神戸市中央区港島中町6-13-1
 NOEVIR GROUP

お問い合わせは
 常盤薬品工業株式会社
 お客さま相談室 0120-875-710まで

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあ
 るので、このような症状の持続または増
 強がみられた場合には、服用を中止し、
 この箱を持って医師、薬剤師または登録
 販売者に相談してください
 口のかわき、便秘、下痢
- 4.2週間位服用しても症状がよくなりな
 い場合は服用を中止し、この箱を持って医
 師、薬剤師または登録販売者に相談して
 ください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

使用期限

製造番号

製造販売元

新生薬品工業株式会社
 奈良県高市郡高取町清水谷1269



092220
 SYKE501



:箱
 中仕切り

