

2010年10月改訂

第2類医薬品

にきび治療薬 ミックファイ®にきび治療クリーム

ミックファイにきび治療クリームの特徴

- 3つの成分を配合したバニシングタイプのクリームで、のびがよく、べとつかず、また塗ったあともお肌で目立たないにきび治療薬です。
- 3つの効果でにきびを治療します。
 - ①角質をやわらかくし、毛穴につまった皮脂の分泌を促し、患部を清潔に保ちます。
 - ②余分な皮脂を吸収します。
 - ③はれ、発赤や細菌による炎症を鎮め、患部の炎症をおさえます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 1.次の人は、使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
 - (6) 深い傷やひどいやけどの人。
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚・	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

(必ず裏面もお読み下さい)

効能・効果

にきび

用法・用量

1日2～3回適量を患部にすりこみます。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法、用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

成分・分量（1g中）

成分	分量
イオウ	30mg
レゾルシン	20mg
グリチルレチン酸	3mg

添加物として、無水ケイ酸、セタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ベントナイト、セチル硫酸Na、プロピレングリコール、モノステアリン酸グリセリン、乳酸、ピロ亜硫酸Na、パラベンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。）
- (4) 使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

シミックCMO富山株式会社 お客様相談室

☎0120-86-3504（フリーダイヤル）

受付時間：月～金曜日 9:00～17:00（祝日を除く）

製造販売元：シミックCMO富山株式会社
〒933-0251 富山県射水市有磯2-37