

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

チールA

CHILL-A

外用消炎鎮痛液剤 / 塗り薬

特 長

- *l*-メントールのさわやかな刺激による血行改善と、サリチル酸グリコールの経皮吸収により、肩こり、筋肉痛等にすぐれた消炎鎮痛効果を発揮します。
- 液剤ですので、患部に塗るだけで薬剤が皮ふからすばやく浸透します。
- 肌にやさしい抗炎症薬グリチルリチン酸やビタミンEを配合した微香性の消炎鎮痛液剤です。
- 塗布面がヨコ向きですから毛生部や関節部のほか、肩や首筋等にも楽にご使用いただけます。



使用上の注意

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)をおこしたことがある人

2. 次の部位には使用しないこと

1) 目の周囲、粘膜等 2) 湿疹、かぶれ、傷口

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

1) 本人又は家族がアレルギー体質の人

2) 今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)をおこしたことがある人



2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談すること

1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み

2) 5～6日間使用しても症状の改善が認められない場合

【効能又は効果】

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、しもやけ、打撲、捻挫、骨折痛

【用法及び用量】

適量を1日数回患部に塗布して下さい。

- 1.15歳未満の人に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ、13歳未満の人には使用しないで下さい。
- 2.目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯でよく洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受けて下さい。
- 3.外用にのみ使用し、内服しないで下さい。
- 4.入浴の1時間前には使用しないで下さい。使用直後に入浴すると強い刺激を感じることがあります。
- 5.皮ふの弱い人は、同じ所に続けて使用しないで下さい。
- 6.使用前に腕等に少量を塗布し、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み等の症状があらわれないことを確かめてから使用して下さい。
- 7.塗布した所はよく乾かして下さい。乾かないうちに衣類等が触れると、変色することがありますので注意して下さい。
- 8.強い刺激を感じた場合には、よく泡立てた石鹸でやさしく患部を洗い流し、その後よく冷やして下さい。


【成分及び分量】 有効成分 100mL中

成 分	分 量	はたらき
ℓ-メントール	6.0g	知覚神経を軽くマヒさせる
サリチル酸グリコール	6.5g	炎症を抑え痛みをやわらげる
ノニル酸ワニリルアミド	8mg	血行をよくする
ビタミンE酢酸エステル	0.5g	血行をよくする
グリチルリチン酸	0.1g	炎症を抑える

添加物としてアルコール、ゲラニオール、水を含みます。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 2.直射日光をさけ、キャップを閉めて涼しい所に保管して下さい。
- 3.誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- 4.本剤配合のアルコール等は、プラスチック製品や家具・調度品等の塗装を傷つけることがありますので、薬液がつかないように注意して下さい。
- 5.使用期限（容器底面・小箱底面に記載）を過ぎた製品は使用しないで下さい。
- 6.火気に近づけないで下さい。



【内容量】 82mL

【お客様相談室】TEL.03-3241-2121(代)

(受付時間 9:00～17:00／土・日・祝日は除く)