

ご使用に際してこの説明文書を必ず
お読みください。また、必要なときに
読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

【してはいけないこと】

⊗ (守らないと現在の症状が悪化
したり、副作用がおこりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- 1) 目の周囲、粘膜など
- 2) 湿疹、かぶれ、傷口

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬
剤師又は登録販売者に相談
すること

- ・薬などによりアレルギー症
状をおこしたことがある人

2. 使用後、皮膚に発疹・発赤、
かゆみ、かぶれ、痛みなどの
症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるため、直
ちに使用を中止し、この説明
文書をもって医師、薬剤師又
は登録販売者に相談すること

3. 5～6日間使用しても症状が
よくならない場合は使用を
中止し、この説明文書をもっ
て医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること

【効能又は効果】

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、
関節痛、しもやけ、打撲、捻挫、骨折痛

【成分及び分量】

有効成分 100mL中

ℓ-メントール……………6.0g

サリチル酸グリコール……………6.5g

ノニル酸ワニリルアミド……………8mg

ビタミンE酢酸エステル……………0.5g

グリチルリチン酸……………0.1g

添加物としてアルコール、ゲラニ
オール、水含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

①小児の手の届かない所に保管
してください。②直射日光をさけ、
キャップを閉めて涼しい所に保管
してください。③誤用をさけ、品質
を保持するため、他の容器に入れ
かえないでください。④本剤配合
のアルコールなどは、プラスチッ
ク製品や家具・調度品などの塗装
を傷つけることがありますので、
薬液がつかないように注意してくだ
さい。⑤使用期限を過ぎた製品は
使用しないでください。⑥火気に
近づけないでください。

すっきり爽快タイプ

大正製薬

肩こり
100mL

微香性

トクホンチールA

外用鎮痛消炎液剤



肩こり・腰痛・筋肉痛

第3類医薬品

TOKUHON

【用法及び用量】

適量を1日数回患部に塗布してください。

1. 小児に使用させる場合には、保
護者の指導監督のもとに使用
させてください。また、刺激が
強く感じられることがあるため、
13才未満の人への使用はさせ
てください。
2. 目に入らないよう注意してくだ
さい。万一、目に入った場合に
は、すぐに水又はぬるま湯でよく
洗い、症状が重い場合には眼科
医の診療を受けてください。
3. 外用にのみ使用し、内服しない
でください。
4. 入浴の1時間前には使用しない
でください。使用直後に入浴す
ると強い刺激を感じるがあり
ます。
5. 皮膚の弱い人は同じ所に続けて
使用しないでください。
6. 使用前に腕などに少量を塗布
し、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、
痛みなどの症状がおきないこ
とを確かめてから使用してくだ
さい。
7. 塗布した所はよく乾かしてくだ
さい。乾かないうちに衣類など
が触れると、変色することがあ
りますので注意してください。
8. 強い刺激を感じた場合には、よ
く泡立てた石鹸でやさしく患部
を洗い流し、その後よく冷やし
てください。

第3類医薬品

【内容量】100mL 販売名:チールA

火気厳禁 第二石油類

水溶性 危険等級Ⅲ 100mL

大正製薬(株) お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元

株式会社 トクホン

東京都豊島区高田3丁目26番3号

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

すっきり爽快タイプ

大正製薬

腰痛
100mL

微香性

トクホンチールA

外用鎮痛消炎液剤



肩こり・腰痛
筋肉痛

第3類医薬品

100mL 第3類医薬品