

トクホン

40枚



肩こり・腰痛・筋肉痛に

トクホン

外用消炎鎮痛プラスター

40枚
保存袋付
ビタミンE配合


ご使用に際してこの説明文書を
必ずお読み下さい。
また、必要ときに読めるよう
大切に保管して下さい。

押しあける

外用消炎鎮痛プラスター 貼り薬 トクホン

特長

トクホンは、炎症を抑え痛みをやわらげるサリチル酸メチル、血行をよくするビタミンE、
皮膚の炎症を抑えるグリチルレチン酸を配合して、肌にやさしく、筋肉の炎症と痛みを
抑えるのに適した貼り薬です。四スミを丸くして、使用中はがれにくくしています。

⚠ 使用上の注意

■してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる) ☒

1. 次の人は使用しないこと

本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)をおこしたことがある人

2. 次の部位には使用しないこと 1) 目の周囲、粘膜等 2) 湿疹、かぶれ、傷口

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること



1) 本人又は家族がアレルギー体質の人

2) 今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)
をおこしたことがある人

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談すること

1) 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合

2) 5～6日間使用しても症状の改善が認められない場合

■効能又は効果 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、骨折痛、しもやけ

■用法及び用量 薬剤面をおおったはく離紙をはがし、1日数回患部に貼付して下さい。

1. 小児(15歳未満)に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ、乳幼児(7歳未満)には使用しないで下さい。

2. 患部を清潔にしてから使用して下さい。

3. 皮膚の弱い人は、同じ所に続けて使用しないで下さい。

4. 使用前に腕の内側の皮膚の弱い所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の
症状があらわれないことを確かめてから使用して下さい。

■保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。

2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管して下さい。

3. 20枚入袋開封後は保存袋に入れて保管して下さい。

4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

■内容量：40枚入(1枚サイズ6.5cm×4.2cm)

【お客様相談室】TEL. 03-3241-2121(代) (受付時間 9:00～17:00/土・日・祝日は除く)

製造販売元

 株式会社 トクホン 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-1-2

〈成分及び分量 有効成分 膏体100g(0.54m²)中〉

成分	分量	はたらき
ℓ-メントール	6.5 g	知覚神経を軽くマヒさせる
dℓ-カンフル	1.1 g	痛みをやわらげる
サリチル酸メチル	7.3 g	炎症を抑え痛みをやわらげる
ビタミンE酢酸エステル	1.35 g	血行をよくする
グリチルレチン酸	0.18 g	皮膚の炎症を抑える

添加物として酸化亜鉛、ジブチルヒドロキシトルエン、生ゴム、ポリリンペン、ロジンエステル、その他2成分を含有します。