



医薬品

酵素処理高分子体(基剤)採用で
肌にやさしくフィット

肩こり・腰痛・筋肉痛に

トクホン

外用消炎鎮痛
プラスター

ビタミンE
配合

保存袋付

140枚

微香性

ご使用に際してはこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

押しあける



微香性 外用消炎鎮痛プラスター 貼り薬 トクホンE

特 長

トクホンEは、炎症を抑え痛みをやわらげるサリチル酸グリコールに ℓ -メントールと血行をよくするビタミンEを配合した微香性外用消炎鎮痛剤です。本剤は、ポリマー（基剤成分）中に微量に含まれている皮膚刺激成分を酵素等で除去していますので、カブレにくく肌にやさしい貼り薬です。四スミを丸くして、使用中はがれにくくしています。

⚠ 使用上の注意

■してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる）

1. 次の人は使用しないこと
本剤によるアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）をおこしたことがある人
2. 次の部位には使用しないこと 1) 目の周囲、粘膜等 2) 湿疹、かぶれ、傷口

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
2) 今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）をおこしたことがある人
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談すること
1) 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合
2) 5～6日間使用しても症状の改善が認められない場合

■効能又は効果 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、骨折痛、しもやけ

■用法及び用量 薬剤面をおおったはく離紙をはきし、1日数回患部に貼付して下さい。

1. 小児（15歳未満）に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ、乳幼児（7歳未満）には使用しないで下さい。
2. 患部を清潔にしてから使用して下さい。
3. 皮膚の弱い人は、同じ所に続けて使用しないで下さい。
4. 使用前に腕の内側の皮膚の弱い所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれないことを確かめてから使用して下さい。

■保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管して下さい。
3. 20枚入袋開封後は保存袋に入れて保管して下さい。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

■内容量 140枚入（1枚サイズ 6.5cm×4.2cm）

■お客様相談室 TEL.03-3241-2121（代）（受付時間 9:00～17:00/土・日・祝日は除く）

製造販売元 株式会社 トクホン 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-1-2



140 枚



■成分及び分量 有効成分 1m²中

成 分	分 量	は た ら き
ℓ -メントール	11.5g	知覚神経を軽くマヒさせる
ビタミンE酢酸エステル	2.5g	血行をよくする
サリチル酸グリコール	3.0g	炎症を抑え痛みをやわらげる

添加物として酸化亜鉛、ジブチルヒドロキシトルエン、生ゴム、リン酸マンガンアンモニウム、ロジンエステル、その他1成分を含有します。