



品名

救 仁 光 成

用法用量

大人十五才以上一回一粒
一日二回、朝夕 食後
白湯にて服用する。

効能効果

動悸、息切れ、気付け

注意

- 一、服用が適さない場合があるの
で、服用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談すること
- 二、服用に際しては、添付文書を
よく読むこと
- 三、直射日光の当たらない湿気の
少ない涼しい所に密栓して保
管すること
- 四、配置期限の過ぎた製品は、服用
しないこと

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

成分分量 (一日量(二粒)中)

ゴオウ牛黄……………二、〇冠
ロクジヨウ鹿茸……………二、〇冠
ジンコウ沈香……………二、四冠
サフラン蕃紅花……………七、五冠
センソ蟾酥……………五、〇冠
ウルソデオキシコール酸……………五、〇冠
d-ボルネオール……………二、四冠
添加物 デヒドロ酢酸Na、グリセリ
ン、タルク、アラビアゴム末、寒梅
粉、薬用炭

第2類
医薬品



外装フィルム

一・二〇粒入

定価九、一〇〇円十^⑤

成光薬品工業株式会社

奈良県北葛城郡広陵町大塚739



配置期限

文書改訂年月
平成二十五年二月

服用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
又、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類
医薬品

JINKYU

生薬強心臓器薬

強心剤

成光

ジン
キユウ
仁救

●健康と心臓の為に朝夕一粒

SEIKO YAKUHIN KOGYO

使用上の注意

⚠ してはいけないこと

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）
小児には服用させないこと
- 本剤を服用している間は、他の強心薬を服用しないこと



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
（一）医師の治療を受けている人。
（二）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（三）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

- 三 五〜六日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分及び分量】

一日量（二粒）中

ゴオウ（牛黄）	二、〇〇〇 麤
ロクジョウ（鹿茸）	一、〇、〇〇 麤
ジンコウ（沉香）	二、〇四 麤
サフラン（番紅花）	七、五 麤
センソ（蟾酥）	五、〇 麤
ウルソデオキシコール酸	五、〇 麤
d-ボルネオール	二、四 麤
添加物として デヒドロ酢酸Na	グリセリン
寒梅粉 薬用炭を含有する。	タルク アラビアゴム末

【用法及び用量】

一日二回 朝夕食後白湯にて服用する。

年齢	一回量	一日服用回数
大人 十五才以上	一粒	二回
十五才未満	服用しないこと	

（用法・用量に関連する注意）

- （一）用法及び用量を厳守すること。
- （二）かまずに服用すること。

【効能又は効果】

動悸、息切れ、気付け

【保管及び取り扱い上の注意】

- （一）直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- （二）小児の手の届かない所に保管すること。
- （三）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- （四）配置期限の過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度

【お問い合わせ先】

相談窓口
電話 〇一・二〇・一四九・九三一
電話 〇七四五・五五・〇〇四四
受付時間 十時〜十七時（土・日・祝日を除く）

TRADE MARK



ホシタカ印

仁救

本舗 成光薬品工業株式会社

電話（〇七四五）五〇〇四四番

