

4 962721 101762



副作用軽減制度 電話 0120-149-931

アレルギー性鼻炎に...

ヨウ化
イソプロパミド



生薬 (サイシン)



はやく効く
ねむくなりにくい
リコソネ®鼻炎顆粒

鼻みず
鼻づまり

ZENEL

頭が重い
なみだ目

のどの痛み

10包入

第②類医薬品

第②類医薬品

はやく効く
ねむくなりにくい

鼻みず
鼻づまり
頭が重い
なみだ目
のどの痛み

リコソネ®鼻炎顆粒 10包入

お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



発売元 **ゼネル** 薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 **ゼネル** 薬工粉河株式会社
和歌山県紀の川市粉河840番地

製造番号

使用期限

⚠ 使用上の注意

❗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 服用後は乗物等の運転をしないで下さい(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)。
3. 長期連用しないで下さい。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。高熱、排尿困難(7) 次の診断を受けた人。緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気力が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

用法及び用量

15歳以上 1回1包、11歳以上15歳未満 1回 2/3包、7歳以上11歳未満 1回 1/2包、3歳以上7歳未満 1回 1/3包、1歳以上3歳未満 1回 1/4包を1日3回毎食後に服用する。*(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。(4)1歳未満の乳児には服用させないで下さい。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

効能又は効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

成分及び分量 3包中(1包1.3g)

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩6mg、dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩100mg、ヨウ化イソプロバミド7.5mg、無水カフェイン150mg、サイシン乾燥エキス30mg

添加物：乳糖、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、サッカリンNa