

どうき、息切れ、氣付に
バルタス・A
BARUTASU・A

どうき、息切れ、氣付に
バルタス・A
BARUTASU・A
[金粒]

128粒

第2類医薬品

どうき、息切れ、氣付に
バルタス・A
BARUTASU・A

お問い合わせ先

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



発売元 **ゼネル** 薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元 **ゼネル** 薬工粉河株式会社
和歌山県紀の川市粉河840番地



4 962721 203077

どうき、息切れ、気付に

バルタス®A

BARUTASU-A

【金粒】

第2類医薬品

成分及び分量 1日量(4粒)中

ジャコウ1.0mg、ゴオウ4.0mg、センソ
5.0mg、ニンジン末17.0mg、サフラン
3.0mg、羚羊角末5.0mg、d-ボルネオール
2.5mg、ユウタン3.0mg、沈香末
18.0mg

添加物：サリチル酸、金箔、寒梅粉

効能又は効果

どうき、息ざれ、気付。

用法及び用量

大人1回2粒

1日2回朝夕に水又は温湯にて服用
して下さい。

* (1) かまずに服用して下さい。(2)
用法・用量を厳守して下さい。(3) 15
才未満の小児は服用しないで下さい。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少
ない涼しい所に保管して下さい。(2)
小児の手の届かない所に保管して
下さい。(3) 他の容器に入れ替えない
で下さい。(誤用の原因になったり、
品質が変わります。)(4) 使用期限を
過ぎた製品は服用しないで下さい。

《使用上の注意》

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副
作用が起こりやすくなります。)

本剤を服用している間は、次の医薬品を
服用しないで下さい。

他の強心薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録
販売者に相談して下さい。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるので直ちに服用を中
止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 5～6日間服用しても症状がよくならな
い場合は服用を中
止し、この外箱を
持って医師、薬剤
師又は登録販売
者に相談して下さい。

製造番号
使用期限