

も煙の胃に
やけに

ZENEL

胃の痛み 胸やけに

20包

5種の健胃生薬配合
胃腸薬イソロ[®]顆粒

ZENEL



第2類医薬品

ZENEL

第2類医薬品

5種の健胃生薬配合

胃腸薬イソロ[®]顆粒

お問い合わせ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



発 売 元 **ゼネル**薬品工業株式会社

大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 **ゼネル**薬工粉河株式会社

和歌山県紀の川市粉河840番地



4 962721 512612



成分及び分量 3包中(1包1.5g)

沈降炭酸カルシウム	1200mg
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	1200mg
ロートエキス3倍散	90mg
ガジュツ末	300mg
ケイヒ末	100mg
ショウキョウ末	100mg
ソウジュツ末	200mg
チンピ末	300mg
添加物：乳糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ℓ-メントール	

用法及び用量

成人(15歳以上)	1回	1包
11歳以上15歳未満	1回	2/3包
8歳以上11歳未満	1回	1/2包

を1日3回食後に服用する。

* (1)用法・用量を厳守して下さい。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3)8歳未満の小児には服用させないで下さい。

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造番号

使用期限

副作用救済制度
電話 0120-149-931

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.透析療法を受けている人は服用しないで下さい。
- 2.本剤を服用している間は、胃腸鎮痛鎮痙薬を服用しないで下さい。
- 3.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)
- 4.長期連用しないで下さい。



■ 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)高齢者。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)次の症状のある人。排尿困難(6)次の診断を受けた人。腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。口のかわき、便秘、下痢
- 4.2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

その他の注意 母乳が出にくくなることがあります。

効能又は効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛、食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）