

●あせも●ただれ●かぶれ

エルキス[®]N

第2類医薬品

ZENEL

第2類医薬品

鎮痒消炎薬

エルキス[®]
N

ERX

●しっしん
●ただれ
●かぶれ

鎮痒消炎薬
エルキス[®]
N

ERX

32g

●あせも
●ただれ
●かぶれ



第2類医薬品

32g

ソフトなクリームタイプ



4 962721 203411



成分及び分量(100g 中)

ジフェンヒドラミン	1g
リドカイン	0.5g
イソプロピルメチルフェノール	0.1g
酸化亜鉛	5g
添加物：ステアリン酸、セタノール、ステアリン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート60、グリセリン、ジメチルポリシロキサン、パラベン、l-メントール	

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

副作用救済制度 電話 0120-149-931



使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能又は効果

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法及び用量

- 1 日数回、適量を患部に塗布する。
 - (1) 用法・用量を厳守すること。
 - (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
 - (3) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
 - (4) 外用にのみ使用すること。

製造
番号

使用
期限

お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社 電話番号：06-6352-2381
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



発 売 元
ゼネル 薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元
ゼネル 薬工粉河株式会社
和歌山県紀の川市粉河840番地