

肩こり・手足の冷え・しびれの緩和に

新ハイゼリーエースE

ビタミンE主薬製剤

〔特 徴〕

中高年になると身体の機能が徐々に低下して内分泌系の乱れや血液循環の低下が起こり、肩・首すじのこり、手足のしびれ、冷え等の症状があらわれてきます。

新ハイゼリーエースEは、体内における過酸化脂質の増加を防止する働きのあるビタミンEを300mg配合し、さらにコンドロイチン、人参（紅参）及び神経系のビタミンと言われるビタミンB₁・B₆・B₁₂を配合して、末梢血管の血行を改善するとともに、更年期などに起こるホルモン分泌の乱れによる諸症状の緩和に有効なビタミンE主薬製剤です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合

3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談してください
4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、下痢

〔効能・効果〕

●末梢血行障害による次の諸症状の緩和：

肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ

●更年期における次の諸症状の緩和：

肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ

●月経不順

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても症状の改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

●次の場合のビタミンEの補給：老年期

（必ず裏面もお読みください）

〔用法・用量〕

年 齢	1.回量	用 法
成人(15才以上)	1カプセル	1日3回食後服用してください。
15才未満	服用しないでください。	

＜用法や用量に関する注意＞

- 定められた用法、用量を守ってください。

〔成 分〕1日量(3カプセル)中

成 分	分 量	はたらき
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	300mg	体内不飽和脂肪酸を安定に保ち、過酸化脂質(変質した脂肪)の増加を防止し、動脈硬化などによって起こる末梢血管の血行不良を改善して、手足のしびれ、冷え、しもやけなどの症状をやわらげます。また、脳下垂体-副腎系に作用して更年期に起こるホルモン分泌などの乱れによる不快な症状を改善します。
コンドロイチン硫酸 ナトリウム	270mg	全身の無数の細胞を結びつけている結合組織の主成分で、栄養分や水分を細胞に供給したり、老廃物を排泄したりする栄養代謝に重要な働きをします。
人参(紅参)乾燥エキス (原生薬換算1050mg)	105mg	新陳代謝をさかんにし、血行をよくするので手足のしびれ、冷えに有効とされています。
ビスベンチアミン (ビタミンB ₁ 誘導体)	25mg (塩酸チアミンとして21.9mg)	ビタミンB群は身体の代謝機能を活発にし、アミノ酸代謝や神経組織の新陳代謝を促します。そのため末梢神経の働きを活発にし、末梢の血行を改善して手足のしびれや肩・首すじのこりなどに効果があります。
塩酸ピリドキシン (ビタミンB ₆)	50mg	
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	60μg	

添加物として、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、バレイショデンプン、ゼラチン、赤色二号、黄色五号、黄色三二酸化鉄、酸化チタン及びラウリル硫酸ナトリウムを含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)カプセル剤は湿気の影響を受けやすいので、ぬれた手などで触れたカプセルは容器にもとさないよう注意してください。
- (5)外箱に表示の使用期限内に服用してください。また、使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室
TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)
月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日を除く)



製造発売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

