

湿疹・皮膚炎治療薬

プレバリン[®]αクリーム

患部で効き体内で低活性

〔特 徴〕

プレバリンαクリームは、しっしん・皮膚炎に優れた効果を示すアンテドラッグタイプのステロイド剤です。

しっしん、皮膚炎、あせもなどの皮膚病は日常よく見られますが、かゆみや発赤が強いと、無意識のうちにかきこわしてしまい、症状をさらに悪化させてしまう場合があります。

プレバリンαクリームは、このような炎症を抑えるステロイド剤にかゆみを効果的に抑える成分を配合したベトつきにくい、使用感のよいクリームタイプの皮膚疾患治療薬です。

アンテドラッグとは：

皮膚表面の患部では抗炎症効果の高いステロイド剤として働き、体内に吸収されていくと分解され、作用が弱くなる薬剤です。



⚠ 使用上の注意

本剤を顔面には広範囲又は長期間使用しないでください。

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2)目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)。

2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。
- (6)妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合

(必ず裏面もお読みください)

〔効能・効果〕

しっしん、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗布してください。

＜用法や用量に関する注意＞

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)本剤を塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (5)本剤の使用後、わずかにほてり（熱感）を感じることがありますが、ごく短時間に消失します。

〔成分〕 100g中

吉草酸酢酸ブレドニゾロン.....0.15g
酢酸トコフェロール0.5g
リドカイン1g
イソプロピルメチルフェノール0.1g
添加物として、エデト酸ナトリウム、クエン酸、軽質流動パラフィン、ステアリルアルコール、白色ワセリン、濃グリセリン、セチル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル及びその他2成分を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)外箱に表示の使用期限内に使用してください。また、使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080(ダイヤルイン)

月～金曜日 9:00～17:00(祝祭日を除く)



製造発売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

