

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

目の疲れ、充血に

エスビアン®S

ESBIEN®S

眼科用薬
第3類医薬品

目の保健上必要とされるビタミンはいくつかありますが、特にビタミンB₂の役割は重要です。ビタミンB₂が欠乏しますと、目の組織全体の働き（新陳代謝）が低下し、その結果として、目が疲れ易くなり、目の病気にもかかり易くなります。

ビタミンB₂には、いくつかの型がありますが、本剤に使用されているフラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム（FAD）は、補酵素型B₂と呼ばれるもので、点眼した場合、普通のB₂に比べてより効果的です。

エスビアンSは、このFADを主体とし、網膜や角膜の栄養をたかめるビタミンB₆、目の組織の保護、角膜の透明性保持などの働きをするコンドロイチン、修復効果を有するアラントインなどを配合した保健目薬です。

〔特 徴〕

*エスビアンSはこのような方に

- 目に異常（疾患）がないのに、目が疲れ易い方
- 目を特に酷使する職業の方
- ドライバーなどで、夜間目を使う方
- 目のすぐ充血し易い方
- やに目・ただれ目のひどい方
- コンタクトレンズを使用し、角膜などに炎症を起し易い方



⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみ改善されない場合
- (3) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

(必ず裏面もお読みください)

〔効能・効果〕

目の疲れ、結膜充血、眼瞼炎（まぶたのただれ）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

〔用法・用量〕

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。
- (5) 定められた用法・用量を守ってください。
- (6) 液色は、成分の色です。誤って衣服等に付着した場合には、水で洗い落としてください。

〔成分〕

成分	分量	はたらき
フラビンアデニンジヌクレオチド ナトリウム（FAD）	0.02%	目の新陳代謝や栄養補給を活発にして、弱った目の諸機能を回復させますので、目の疲れなどに効果的です。
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	0.01%	
コンドロイチン硫酸ナトリウム	0.10%	角膜細胞に働いて、目の生理機能の回復を助けます。また、角膜表層を保護して諸症状の改善を促進させます。
アラントイン	0.10%	組織修復効果がありますので、目に生じた傷やただれの回復を早めます。

添加物として、ホウ酸、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、pH調節剤及び等張化剤2成分を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室
TEL 03-3661-2080（ダイヤルイン）
受付時間 9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
フリーダイヤル ☎0120-149-931



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

