

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ー 総合感冒薬 ー

ジキニン[®]C

第2類医薬品

ジキニンCは、鎮咳剤ジヒドロコデインリン酸塩や解熱鎮痛剤アセトアミノフェン、鎮咳去痰作用のある生薬カンゾウ（甘草）エキス、かぜで消耗しやすいアスコルピン酸（ビタミンC）などを配合した、かぜによる頭痛、発熱、のどの痛みなどによく効く、総合感冒薬です。

【使用上の注意】



してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。）

1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

（眠気があらわれることがある。）

4. 服用時は飲酒しないでください。

5. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人。
- (4)高齢者。
- (5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7)次の症状のある人。

高熱、むくみ、排尿困難

(8)次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸痛しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。

肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくならない場合。

- 3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。**
便秘、口のかわき

【効能・効果】

かぜの諸症状（頭痛、発熱、のどの痛み、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

【用法・用量】

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15才以上	1 包	3回
11才以上 15才未満	2/3包	
7才以上 11才未満	1/2包	
3才以上 7才未満	1/3包	
1才以上 3才未満	1/4包	
1才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成 分】（1包 1.5g中）

ジヒドロコデインリン酸塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 mg
 アセトアミノフェン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300 mg
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・・・・・・・・・・ 1.17 mg
 アスコルビン酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83.3 mg
 L-アスコルビン酸ナトリウム・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83.3 mg
 無水カフェイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 mg
 カンゾウ(甘草)エキスパウダー・・・・・・・・・・・・・・ 96 mg(原生薬換算量 750 mg)
 添加物としてタルク、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、白糖を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）



製造販売元 **全薬工業株式会社**

東京都豊島区東池袋3-22-14
 営業所 東京都文京区大塚5-6-15
<http://www.zenyaku.co.jp>