

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ステイブ[®]胃腸薬

ステイブ胃腸薬は、

1. 弱った胃に活力を与えるガジュツ末など各種健胃生薬
 2. 脂肪の消化を助けるウルソデオキシコール酸
 3. 傷んだ胃粘膜を保護するカンゾウ(甘草)末
- を配合した胃の弱い方などのための胃腸薬です。

【使用上の注意】



相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)次の診断を受けた人。

腎臓病

2. 次の場合は、服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

2週間位服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

便秘、下痢

【効能・効果】

- もたれ(胃もたれ)、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、胃弱
- 食べすぎ(過食)、飲みすぎ(過飲)、消化不良、消化促進、食欲不振(食欲減退)、胃重
- はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
- 胸やけ、胸つかえ、胃酸過多、げっぷ(おくび)、胃痛

【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15才以上	1 包	3 回
11才以上 15才未満	2 / 3 包	
8才以上 11才未満	1 / 2 包	
5才以上 8才未満	1 / 3 包	
3才以上 5才未満	1 / 4 包	
3才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

【成 分】（1 包 1.5 g 中）

ガジュツ末	100 mg
ウルソデオキシコール酸	10 mg
カンゾウ(甘草)末	120 mg
オウレン末	80 mg
ケイヒ末	75 mg
ゲンチアナ末	40 mg
チョウジ末	40 mg
コショウ末	8 mg
炭酸水素ナトリウム	530 mg



ガジュツ

添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、*l*-メントール、アセニヤク、アマチャ、ケイ酸A₁、ステアリン酸M₈、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルスターチ、*d*-ボルネオール、無水ケイ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) お客様相談室
住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-22-14
電話：03 (3986) 0613
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）



製造販売元

全薬工業株式会社

東京都豊島区東池袋3-22-14
営業所 東京都文京区大塚5-6-15
<http://www.zenyaku.co.jp>